

CETIRIZINE diHCI Tablet

KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung Cetirizine dihydrochloride 10 mg

CARA KERJA OBAT :

Cetirizine merupakan antihistamin selektif reseptor H1 dengan efek sedative yang rendah pada dosis aktif farmakologi dan mempunyai sifat tambahan sebagai anti alergi. Cetirizine menghambat pelepasan histamin pada fase awal dan mengurangi migrasi sel inflamasi.

INDIKASI :

Untuk pengobatan rhinitis parenial, rhinitis alergi dan urtikaria kronik idiopatik

DOSIS :

Dewasa dan anak-anak diatas 12 tahun: 1 tablet / hari

KONTRA INDIKASI :

- Karena kurangnya data klinis, sebaiknya jangan digunakan selama semester pertama kehamilan atau saat menyusui
- Penderita ginjal berat
- Hindari penggunaan pada wanita hamil dan menyusui karena diekskresikan melalui air susu

EFEK SAMPING :

- Sakit kepala, pusing, rasa kantuk, agitasi, mulut kering dan rasa tidak enak pada lambung
- Pada beberapa individu dapat terjadi reaksi hipersensitifitas termasuk reaksi kulit dan angioderma

PERINGATAN DAN PERHATIAN :

- Tidak dianjurkan meminum obat pada pasien yang sedang mengendarai kendaraan bermotor dan mengoperasikan mesin
- Hindari penggunaan bersamaan dengan minuman beralkohol atau obat-obat penekan susunan saraf pusat, karena dapat memperberat penurunan kewaspadaan serta gangguan kinerja susunan saraf pusat
- Hati-hati pada penggunaan pada penderita gangguan fungsi ginjal
- Keamanan penggunaan pada anak usia dibawah 6 bulan belum ditetapkan. Tidak direkomendasikan untuk anak usia dibawah 6 bulan

INTERAKSI OBAT :

- Interaksi dengan obat-obat lain belum diketahui
- Pada percobaan memperlihatkan potensiasi Cetirizine Dihidroklorida terhadap alkohol (level alkohol 0,8%) oleh karena itu sebaiknya jangan diberikan bersamaan
- Pemberian bersama 20 mg Cetirizine dihidroklorida dan 400 mg simetidin tidak mempunyai efek pada reaksi kulit yang dipicu oleh reaksi histamine, dibandingkan pemberian Cetirizine Dihidroklorida tunggal. Konsentrasi plasma jelas tidak terpengaruh pada pemberian bersama simetidin
- Pada percobaan dengan 5 mg diazepam dan 10 mg Cetirizine Dihidroklorida secara bersamaan tidak menyebabkan interaksi pada 15 dari 16 fungsi fisiologis yang diukur

OVER DOSIS :

- Rasa kantuk
- Dapat terjadi agitasi pada anak-anak
- Pada kasus over dosis yang parah, tidak ada antidote yang spesifik tapi dapat dilakukan kuras lambung disertai terapi suportif lainnya

CARA PENYIMPANAN :

Simpan pada suhu dibawah 30 °C

KEMASAN :

Dus, 3 strip @ 10 tablet

No. Reg: GKL1007119810A1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo – Indonesia