

ATAGIP Tablet

KOMPOSISI :

Tiap tablet mengandung :	
Attapulgit aktif	600 mg
Pectin	50 mg

CARA KERJA OBAT :

Dapat mengadsorbsi beberapa racun dan bakteri penyebab diare. Dapat mengurangi frekuensi buang air besar dan memperbaiki konsistensi feses yang encer.

INDIKASI :

Untuk pengobatan simptomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya.

DOSIS :

- Dewasa dan anak – anak diatas 12 tahun : 2 tablet setiap setelah buang air besar maximum penggunaan 12 tablet dalam 24 jam.
- Anak – anak 6 – 12 tahun : 1 tablet setiap setelah buang air besar maximum penggunaan 6 tablet dalam 24 jam.

KONTRA INDIKASI :

- Jangan diberikan pada pasien dimana konstipasi harus dihindari.
- Hypersensitif terhadap attapulgit dan pectin
- Penderita obstruksi usus.

EFEK SAMPING :

Pemberian bersama digoxin akan menurunkan kadar digoxin dalam darah

INTERAKSI OBAT :

- Penggunaan bersama – sama obat – obatan yang mengandung alkaloid, vitamin hormon dan lain – lain akan menonaktifkan zat – zat tersebut karena daya absorpsi dari attapulgit.
- Pemberian bersama dengan digoxin menurunkan kadar digoxin dalam darah.

PERINGATAN DAN PERHATIAN :

- Diare dapat mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit karena itu diperlukan tambahan cairan oral rehidrasi.
- Jika diare pada anak – anak disertai dengan dehidrasi maka pengobatan awal harus diberikan cairan rehidrasi oral.
- Jangan diberikan pada anak – anak umur ≤ 3 tahun kecuali atas petunjuk dokter.
- Dapat mempengaruhi absorpsi obat lain didalam saluran pencernaan, oleh karena itu dianjurkan interval waktu 2-3 jam antara pemberian oral obat lain dengan obat ini.
- Jangan diberikan lebih dari 2 hari atau dalam keadaan demam tinggi.
- Jika gejala – gejala masih berlangsung terus konsultasi kedokter.

CARA PENYIMPANAN :

Simpan pada suhu di bawah 30 °C

KEMASAN :

Dus 24 kotak @ 10 tablet

No. Reg. : DBL9507102110A1

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo - Indonesia