

FLUCIDERLON ACETONIDE Cream

KOMPOSISI

Tiap gram krim mengandung Fluocinolone acetonide 0,25 mg

INDIKASI

Untuk meringankan manifestasi inflamasi dan pruritis pada dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid

CARA KERJA OBAT

Fluocinolone acetonide merupakan steroid antiinflamasi sintetik mempunyai efek anti inflamasi, anti pruritik dan anti alergi.

Mekanisme kerjanya berhubungan dengan vasokonstriksi dan penekanan permeabilitas membran dan pelepasan mediator inflamasi.

DOSIS DAN POSOLOGI

Oleskan tipis di tempat yang sakit 2 – 4 kali sehari

EFEK SAMPING

Dapat timbul rasa seperti terbakar, gatal, iritasi, kekeringan pada kulit, infeksi sekunder, folikulitis, hipertrikosis, hipopigmentasi, dermatitis kontak, maserasi kulit, atropi kulit, striae dan miliaria

KONTRA INDIKASI

- Hipersensitif terhadap komponen obat ini
- Infeksi primer pada kulit karena bakteri, fungi atau virus
- Rosacea, acne, peri-oral dermatitis, kemerahan karena pembalut, anogenital pruritus
- Anak dibawah 2 tahun

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Bila timbul iritasi, pemakaian harus dihentikan
- Pada kasus infeksi, harus dikombinasikan dengan preparat antibakteri atau antijamur
- Obat ini bukan untuk mata
- Hindari kontak dengan mata, jika terjadi kontak dengan mata dan timbul iritasi yang berat, segera bilas dengan air dalam jumlah yang banyak
- Absorpsi sistemik dari kortikosteroid topikal dapat menyebabkan HPA (Hypothalamic Pituitary Adrenal) secara reversibel, penekanan terhadap sendi-sendi, manifestasi cushing's syndrome, hyperglycaemia dan glucosuria pada beberapa pasien
- Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan superinfeksi
- Jangan membalut, menutup ataupun membungkus area kulit yang diobati kecuali atas petunjuk dokter. Pembalut jangan digunakan untuk anak atau wajah
- Penderita sebaiknya memberi keterangan lengkap atas reaksi efek samping yang timbul terutama akibat dari pembalut
- Hati-hati penggunaan kortikosteroid topikal pada ibu menyusui dan wanita hamil.

OVERDOSIS

Penggunaan berlebihan kortikosteroid dapat menyebabkan absorpsi dalam jumlah cukup besar yang dapat menghasilkan efek sistemik (lihat Peringatan dan Perhatian)

Hanya untuk pemakaian pada kulit

CARA PENYIMPANAN

Simpan pada suhu di bawah 30°C

KEMASAN

Dus, pot @ 10 gram

Dus, tube @ 10 gram

No. Reg. : DKL1007120729A1

No. Reg. : DKL1007120729A2

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo – Indonesia