

GENTAMICIN SULFATE Salep

KOMPOSISI :

Tiap gram salep mengandung Gentamicin sulfat yang setara dengan Gentamicin 1 mg

CARA KERJA OBAT :

Gentamicin merupakan antibiotika aminoglikosida dengan sifat bakterisidal terutama untuk basil aerobik gram negatif yang peka, gram positif yang peka hanya *Staphylococcus aureus*

INDIKASI :

Pengobatan topikal untuk infeksi kulit primer maupun sekunder karena bakteri yang rentan terhadap Gentamicin. Tidak untuk pencegahan karena untuk itu penyebab tidak diketahui dengan pasti.

DOSIS :

Oleskan secara tipis di permukaan kulit yang sakit tiga sampai empat kali sehari. Bagian yang sakit dapat ditutupi dengan pembalut tipis. Bila ada kerak (krusta) harus dihilangkan terlebih dahulu. Tukak statis terinfeksi memberi respon yang baik terhadap gentamicin salep dengan kompres gelatin. Pengobatan kulit sekitar tukak bersama dengan suatu kortikosteroid topikal membantu mengontrol inflamasi.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang hipersensitifitas terhadap gentamicin dan komponen obat, infeksi virus dan jamur.

EFEK SAMPING :

- Pemakaian gentamicin topikal menyebabkan iritasi sementara (eritema & pruritus)
- Kemungkinan fotosensitisasi pada beberapa pasien namun tidak dapat diungkapkan kembali dengan pemakaian kembali gentamicin diikuti dengan pemajanan terhadap radiasi ultraviolet
- Dapat menimbulkan iritasi ringan dan alergi seperti rash.

PERINGATAN DAN PERHATIAN :

- Hentikan pengobatan bila terjadi iritasi atau sensitisasi.
- Dapat terjadi pertumbuhan yang berlebihan dari organisme yang tidak rentan, begitu terjadi super infeksi, hentikan pengobatan dan mulailah dengan terapi yang sesuai.
- Tidak untuk pemakaian mata.

INTERAKSI OBAT

Dapat terjadi alergi silang antar aminoglikosida

OVERDOSIS

Gejala:

Kelebihan dosis tunggal Gentamicin tidak menyebabkan gejala apa-apa. Pemakaian jangka panjang dalam jumlah besar dari Gentamicin topikal dapat menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan dari lesi oleh jamur atau bakteri yang tidak rentan.

Pengobatan:

Bila terjadi pertumbuhan yang berlebihan diindikasikan terapi dengan antifungal atau antibakteri yang sesuai.

CARA PENYIMPANAN :

Simpan pada suhu di bawah 30 °C

KEMASAN :

Dus, tube @ 5 g No. Reg. : GKL1007119730A1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo – Indonesia