

MOMETASONE FUROATE 0,1% Krim

KOMPOSISI

Tiap gram krim mengandung 1 mg Mometasone Furoate

CARA KERJA OBAT

Mometasone furoate merupakan kortikosteroid sintetik yang mempunyai sifat anti inflamasi, anti pruritik dan vasokonstriktif.

INDIKASI

Untuk meringankan manifestasi inflamasi dan pruritus dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid seperti psoriasis dan dermatitis atopik.

DOSIS

Oleskan krim tipis-tipis pada daerah yang sakit sehari sekali.
Jangan ditutup dengan kasa pembalut.

KONTRA INDIKASI

- Tuberkulosis
- Herpes simplex
- Varicella
- Penderita yang sensitif terhadap Mometasone furoate, kortikosteroid lainnya atau terhadap salah satu komponen dari sediaan ini.

EFEK SAMPING

- Parastesia, pruritus dan tanda-tanda atrofi kulit.
- Efek samping lokal yang jarang dilaporkan akibat pemakaian kortikosteroid topical : rasa terbakar, gatal, iritasi, kulit kering, folikulitis, hipertrikhosis, erupsi menyerupai jerawat, hipopigmentasi, dermatitis perioral, dermatitis kontak alergi, maserasi kulit, infeksi sekunder, atrofi kulit, striae dan mililaria.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Tidak untuk pemakaian pada mata.
- Bila terjadi iritasi atau sensitisasi, hentikan pemakaian dan diberikan terapi yang sesuai.
- Bila ada infeksi, harus diberikan preparat antifungal atau antibacterial yang sesuai. Bila respon yang diinginkan tidak terjadi, kortikosteroid harus dihentikan sampai infeksi teratasi dengan baik.
- Jangan digunakan pada pasien hamil dalam jumlah besar atau dalam jangka panjang.
- Hati-hati penggunaan pada wanita hamil, karena keamanan pemakaian pada wanita hamil belum ditetapkan. Pemakaian kortikosteroid topical selama kehamilan hanya bila potensi manfaatnya lebih besar daripada potensi risikonya terhadap janin.
- Hentikan pemakaian bila terjadi iritasi.
- Terapi dengan kortikosteroid dilakukan bila terapi obat lain yang kurang toksik tidak efektif.
- Setiap efek samping yang pernah dilaporkan dengan pemberian kortikosteroid, termasuk supresi adrenal, juga dapat terjadi dengan kortikosteroid local, terutama pada bayi dan anak-anak. Absorpsi sistemik dari kortikosteroid topical akan ditingkatkan bila permukaan kulit yang diobati luas bila digunakan secara oklusif. Harus diberikan perhatian yang sesuai pada kondisi demikian ini atau bila diberikan dalam jangka waktu panjang terutama pada bayi dan anak-anak. Pasien pediatric mungkin memperlihatkan kerentanan yang lebih besar atas supresi poros hipotalamus pituitaria akibat induksi kortikosteroid topical dan sindroma chusing daripada pasien dewasa karena rasio luas permukaan kulit dibanding berat badannya yang lebih besar. Terapi kortikosteroid kronis dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Karena belum diketahui apakah komponen dari produk ini diekskresikan dalam air susu ibu yang sedang menyusui maka harus diambil keputusan apakah menghentikan menyusui atau menghentikan pemakaian obat dengan mempertimbangkan pentingnya pemakaian obat bagi si ibu.

INTERAKSI OBAT

-

CARA PENYIMPANAN

Simpan pada suhu dibawah 30 °C.

KEMASAN

Dus, Tube @ 5 gram

No.Reg. GKL 0807118329 A1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo - Indonesia