

ONDANSETRON HCl DIHYDRATE

KOMPOSISI :

Tiap tablet salut selaput mengandung Ondansetron HCl dihydrate 10 mg yang setara dengan Ondansetron 8 mg.

CARA KERJA OBAT :

Ondansetron suatu antagonis reseptor 5HT₃ yang bekerja secara selektif dan kompetitif dalam mencegah maupun mengatasi mual dan muntah akibat pengobatan dengan sitostatika dan radioterapi.

INDIKASI :

Penanggulangan mual dan muntah karena kemoterapi dan radioterapi serta operasi.

DOSIS :

- Pencegahan mual dan muntah pasca bedah :
Dosis pertama : 8 mg, tablet diberikan 1 jam sebelum pembiusan dilanjutkan pemberian 2 dosis berikutnya 8 mg tablet dengan interval waktu masing-masing 8 jam.
- Pencegahan mual dan muntah karena kemoterapi
 - Dewasa :
 - Kemoterapi yang sangat emetogenik, misalnya cisplatin. Mula-mula diberikan injeksi 8 mg Ondansetron i.v. secara lambat atau diinfuskan selama 15 menit segera sebelum diberikan kemoterapi, diikuti dengan infus 1 mg Ondansetron/ jam selama terus menerus selama kurang dari 24 jam atau 2 injeksi 8 mg i.v. secara lambat atau diinfuskan selama 15 menit dengan selang waktu 4 jam. Atau bisa juga diikuti dengan pemberian 8 mg peroral 2 kali sehari selama kurang dari 5 hari.
 - Kemoterapi yang kurang emetogenik, misalnya siklospamid. Injeksi i.v. 8 mg Ondansetron secara lambat atau diinfuskan selama 15 menit segera sebelum diberikan kemoterapi, diikuti dengan 8 mg peroral 2 kali sehari selama kurang dari 5 hari.
 - Mual dan muntah karena radioterapi :
Tablet 8 mg, 3 kali/ hari dimulai 1 – 2 jam sebelum radioterapi.
Lama pengobatan tergantung panjangnya radioterapi.
 - Anak-anak > 4 tahun :
5 mg/ ml secara i.v selama 15 menit segera sebelum diberikan kemoterapi, diikuti dengan memberikan 4 mg peroral tiap 12 jam selama kurang dari 5 hari.
 - Usia lanjut :
Ondansetron dapat ditoleransi dengan baik pada penderita usia di atas 65 tahun tanpa mengubah dosis, frekuensi, ataupun cara pemakaian.
 - Penderita dengan gangguan fungsi ginjal :
Tidak memerlukan penyesuaian dosis harian, frekuensi ataupun cara pemberian.
 - Penderita dengan gangguan fungsi hati :
Dosis total harian tidak boleh lebih dari 8 mg.

KONTRA INDIKASI :

Penderita yang hipersensitif terhadap Ondansetron.

EFEK SAMPING :

Sakit kepala, konstipasi, rasa panas pada kepala dan epigastrium, sedasi dan diare.

PERINGATAN DAN PERHATIAN :

Sebaiknya tidak digunakan pada wanita hamil terutama pada semester pertama dan wanita menyusui, kecuali bila manfaat lebih besar dari resiko yang mungkin terjadi.

INTERAKSI OBAT :

-

OVER DOSIS :

- Pada dosis 84 – 145 mg i.v. terjadi efek samping yang ringan.
- Antidotum yang khusus tidak ada.

CARA PENYIMPANAN :

Simpan pada suhu di bawah 30 °C

KEMASAN :

Dus, 2 strip @ 6 tablet salut selaput

No. Reg. : GKL1707122517A1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo – Indonesia