

TREMACORT CREAM

KOMPOSISI

Tiap gram krim mengandung Triamcinolone acetonide 1 mg

CARA KERJA OBAT

Triamcinolone acetonide biasanya digunakan secara topikal untuk berbagai macam penyakit kulit dan efektif sebagai anti inflamasi, anti pruritik dan vasokonstriksi.

INDIKASI

Tremacort diindikasikan untuk pengobatan tambahan dan untuk penyembuhan sementara pada gejala yang berhubungan dengan luka inflamasi oral dan luka bernanah akibat dari trauma.

DOSIS

Oleskan pada membran mukosa oral, 2 – 3 kali sehari, sesudah makan dan sebelum tidur. Bila dalam 7 hari tidak terdapat perbaikan yang bermakna dan regenerasi jaringan oral, etiologi dari lesi harus diinvestigasi lebih lanjut

KONTRA INDIKASI

- Tuberkulosis kulit
- Infeksi jamur, virus (termasuk herpes simplex dan varicella) serta bakteri pada daerah mulut dan tenggorokan, bila tidak disertai terapi antiinfeksi yang sesuai
- Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat

EFEK SAMPING

Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan efek samping seperti yang terjadi pada penggunaan steroid secara sistemik seperti supresi adrenal, perubahan metabolisme glukosa, katabolisme protein, aktivasi ulkus peptikum dan lain-lain. Efek samping ini biasanya bersifat reversibel dan akan hilang bila penggunaan dihentikan.

PERINGATAN DAN PERHATIAN

- Dapat terjadi supresi adrenal pada penggunaan jangka panjang atau dengan penggunaan perban/plester/dibalut. Efek ini biasanya terjadi pada bayi atau anak-anak sehingga interval penggunaan harus dibatasi sampai 5 hari
- Penggunaan jangka panjang serta pada daerah yang luas dapat menyebabkan pertumbuhan dari mikroorganisme
- Hati-hati penggunaan pada wanita hamil. Penggunaan pada wanita hamil (terutama pada awal kehamilan) hanya diberikan jika manfaat terapeutik lebih besar dibandingkan kemungkinan resiko yang akan terjadi.

OVERDOSIS

Kortikosteroid topikal dapat diabsorpsi dalam jumlah yang cukup untuk menimbulkan efek sistemik. Jika tertelan, pasien harus diawasi dan diobati berdasarkan gejala yang timbul

CARA PENYIMPANAN

Simpan pada suhu di bawah 30°C.

Baik digunakan sampai 2 minggu setelah kemasan dibuka.

KEMASAN

Dus, tube @ 5 gram krim

Dus, tube @ 10 gram krim

No. Reg. : DKL0807118629A1

No. Reg. : DKL0807118629A1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo – Indonesia