

TREQUINON CREAM

KOMPOSISI :

Tiap gram krim mengandung Hidroquinon 40 mg, Tretinoin 0,5 mg dan Fluocinolone acetonide 0,1 mg

CARA KERJA OBAT :

Mengandung Hidroquinon yang merupakan depigmenting agent dan dapat mengganggu satu atau lebih rangkaian jalur tyrosine-tyrosinase pada sintesis melanin. Tretinoin bekerja sebagai keratolitik. Fluocinolone acetonide merupakan golongan kortikosteroid yang bekerja sebagai anti-inflamasi. Mekanisme kerja bahan aktif yang terkandung dalam Trequinon cream untuk pengobatan melasma tidak diketahui.

INDIKASI :

Untuk pengobatan jangka pendek melasma. Trequinon cream tidak diindikasikan untuk pemeliharaan pengobatan melasma. Keamanan dan kemanjuran untuk pengobatan hiperpigmentasi selain melasma pada wajah belum diketahui.

KONTRA INDIKASI :

Untuk individu yang hipersensitif, alergi atau intoleransi terhadap komponen obat ini.

EFEK SAMPING :

- Iritasi lokal seperti kekeringan, kemerahan kulit, rasa terbakar, kulit terkelupas
- Jika terjadi reaksi hipersensitif / iritasi kimia, pengobatan harus dihentikan

PERINGATAN DAN PERHATIAN :

- Tidak diindikasikan untuk pemeliharaan pengobatan melasma. Setelah hasil pengobatan tercapai dapat dilanjutkan dengan pengobatan lain sebab melasma dapat timbul kembali setelah penghentian pemakaian.
- Paparan matahari harus dihindarkan, gunakan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih, payung, topi dan ubahlah untuk tidak menggunakan bentuk hormon sebagai pil KB, bila metode hormon digunakan.
- Mengandung hidroquinon yang dapat menyebabkan exogenous ochronosis, yaitu penggelapan kulit secara berangsur-angsur dan terapi harus cepat dihentikan. Umumnya hal ini terjadi pada kelompok kulit hitam, namun juga dapat terjadi pada kelompok *Caucasians* dan *Hispanics*.
- Keamanan dan kemanjuran obat terhadap pasien dengan kulit tipe V dan VI belum dipelajari.
- Keamanan pada wanita hamil dan menyusui belum ditetapkan.
- Hindarkan paparan dengan sinar matahari atau cahaya ultraviolet. Pasien yang secara terus menerus terpapar sinar matahari atau bahan iritan pada lingkungan kerja atau karena kebiasaan harus lebih berhati-hati. Gunakan sunscreen dan pelindung seperti topi pada daerah yang diobati. Penggunaan sunscreen merupakan aspek penting dalam pengobatan melasma karena minimnya sinar matahari akan menghambat aktivitas melanocytic.
- Cuaca yang ekstrim seperti panas atau dingin dapat mengiritasi pasien yang sedang diobati menggunakan Trequinon cream. Gunakan pelembab pada pagi hari setelah wajah dibersihkan karena efek obat dapat mengeringkan kulit.
- Hindarkan pemakaian pada daerah mata, hidung, atau sudut mulut karena lapisan mukosa pada daerah tersebut lebih sensitif. Hentikan penggunaan obat jika terjadi iritasi lokal atau bertambah parah dan segera konsultasikan dengan dokter.
- Penanganan khusus diperlukan untuk kondisi seperti *allergic contact dermatitis*, *blistering*, *crusting*, *severe burning* dan iritasi pada membran mukosa seperti mata, hidung dan mulut.
- Karsinogenik, mutagenik dan gangguan kesuburan :
 - a. Beberapa penelitian penggunaan hidroquinon pada hewan menunjukkan adanya efek karsinogenik, namun potensi karsinogenik pada manusia tidak diketahui
 - b. Penelitian pada hairless albino mice mengindikasikan bahwa penggunaan tretinoin berpotensi menyebabkan tumor
 - c. Penelitian mutagenic tidak dilakukan dengan kombinasi bahan aktif ini. Hasil penelitian yang dipublikasikan menunjukkan bahwa hidroquinon bersifat mutagen dan clastogen

Kehamilan : efek teratogenik

Mengandung tretinoin yang bersifat teratogen dan dapat menyebabkan kematian janin, gangguan pertumbuhan, cacat janin dan mempunyai potensi *neurologist deficits*. Tidak ada penelitian yang memadai pada wanita hamil.

Hanya digunakan selama kehamilan jika keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan dengan resiko bagi janin.

INTERAKSI OBAT :

- Dengan sabun / cleanser yang bersifat abrasive, kosmetik yang mempunyai sifat mengeringkan, mengandung alkohol dan astringent tinggi
- Kosmetik yang menimbulkan photosensitizing

CARA PENYIMPANAN :

Simpan pada suhu di bawah 30°C

KEMASAN :

Dus, Tube @ 10 gram

No. Reg. : DKL1107121029A1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo – Indonesia

