

WICLIN

KOMPOSI :

Tiap kapsul mengandung : Tetracyclin HCl..... 500 mg

CARA KERJA OBAT :

Tetracyclin merupakan antibiotika bakteriostatik berspektrum luas, bekerja mempengaruhi sintesa protein dengan memblokir ikatan aminoasil t-RNA ke m-RNA kompleks ribosom.

INDIKASI :

Pneumonia, infeksi yang disebabkan oleh Rickettsiae, infeksi saluran kemih, bronchitis, infeksi-infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus dan Streptococcus. Untuk penderita gonorrhoe dan sifilis tahap tertentu yang tidak tahan terhadap penicillin.

DOSIS :

Dewasa : 250 – 500 mg setiap 6 jam tergantung dari tingkat keparahan penyakit.

Anak diatas 8 tahun : 25 – 50 mg/kgBB sehari, dibagi dalam 4 dosis. Dosis maksimum tidak melebihi orang dewasa.

Tetapi sebaiknya tidak diteruskan paling sedikit 2 hari setelah gejala hilang.

Obat sebaiknya diminum satu jam sebelum atau dua jam sesudah makan.

PERINGATAN DAN PERHATIAN :

- Sebaiknya diberikan satu jam sebelum atau dua jam sesudah makan.
- Penggunaan Tetracyclin pada penderita gangguan fungsi ginjal dapat menimbulkan kumulasi.
- Penggunaan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya super infeksi terutama oleh jamur.

EFEK SAMPING :

- Sistem pencernaan : mual, muntah, diare, glositis, super infeksi oleh jamur.
- Kulit : dermatitis, maculopapular, kemerahan pada kulit.
- Reaksi hipersensitif, urtikaria, anafilaksis dan lupus erythematosus.
- Sistem hematologic : anemia hemolitik, trombositopenia, dan neutropenia.

KONTRA INDIKASI :

- Penderita yang hipersensitif terhadap obat golongan hipersensitif tetracyclin.
- Wanita hamil dan menyusui.
- Anak – anak dibawah usia 8 tahun.

INTERAKSI OBAT :

- Tetracyclin membentuk kompleks dengan ion-ion kalsium, magnesium, besi dan aluminium. Maka sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan tonikum yang mengandung besi atau dengan antasida berupa senyawaan berupa aluminium, magnesium dan susu.
- Tetracyclin memperpanjang kerja antikoagulan kumarin, sehingga proses pembekuan darah berkurang.
- Pengobatan dengan Tetracyclin jangan dikombinasikan dengan penicillin atau sefalosporin.
- Penggunaan bersamaan dengan oral kontrasepsi dapat menurunkan efektifitas oral kontrasepsi.

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di bawah suhu 30° C

KEMASAN :

Dus 10 strip @ 10 kapsul

No. Reg. DKL9907109601B1

HARUS DENGAN RESEP DOKTER

PRODUKSI
PT. FIRST MEDIPHARMA
Sidoarjo - Indonesia